



МСФМ 28
Приложение [XX]

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ

МСФМ 28 ФИТОСАНИТАРНЫЕ ОБРАБОТКИ

ФО [XX]:

**Холодовая обработка против *Ceratitis capitata* на
Citrus reticulata × *C. sinensis***

(201[X] год)

Область применения обработки

Данный вид обработки предполагает холодовую обработку плодов *Citrus reticulata* × *Citrus sinensis*¹ (тангор), что приводит к гибели яиц и личинок *Ceratitis capitata* (средиземноморская плодовая муха) с заявленной эффективностью².

Описание обработки

Наименование обработки	Холодовая обработка против <i>Ceratitis capitata</i> на <i>Citrus reticulata</i> × <i>Citrus sinensis</i>
Действующее вещество	Н/П
Тип обработки	Физическая (холод)
Вредный организм-мишень	<i>Ceratitis capitata</i> (Diptera: Tephritidae) (средиземноморская плодовая муха)

¹ Виды и гибриды *Citrus* названы в соответствии с номенклатурой Коттена, Р. 2002 (Cottin, R. 2002. *Citrus of the world: a citrus directory*. Montpellier, France, INRA-CIRAD).

² Область применения фитосанитарных обработок не включает вопросы касательно регистрации пестицидов и иных внутренних требований договаривающихся сторон при утверждении обработок. Утвержденные МККЗР обработки также могут не предоставлять информацию о специфическом воздействии на здоровье человека и безопасность пищевой продукции, которая подлежит рассмотрению в соответствии с внутренними процедурами до того, как договаривающиеся стороны утвердят обработку. Кроме того, прежде чем вводить применение обработок на международном уровне, следует изучить их потенциальное воздействие на качество продукции для некоторых товаров-хозяев. Однако оценка любого воздействия обработки на качество товаров может потребовать дополнительного рассмотрения. Договаривающаяся сторона не несет никаких обязательств в отношении утверждения, регистрации или внедрения обработок для применения на своей территории.

Целевые подкарантинные материалы Плоды *Citrus reticulata* × *Citrus sinensis* (тангор)

Порядок обработки

Режим 1: 2°C или ниже непрерывно на протяжении 18 дней

Уровень эффективности: эффективная доза (ED)_{99,9970} при уровне достоверности 95%.

Режим 2: 3°C или ниже непрерывно на протяжении 20 дней

Уровень эффективности составляет ED_{99,9970} при уровне достоверности 95%.

Плод должен достичь температуры обработки до начала отсчета времени экспонирования при обработке. Температуру плода следует отслеживать и записывать, температура не должна превышать указанного уровня в течение всей обработки.

Другая важная информация

Может потребоваться предварительное охлаждение товара до температуры обработки.

При оценке данной обработки Техническая группа экспертов по фитосанитарным обработкам (ТГЭФО) рассмотрела вопросы, связанные с температурными режимами и поддержанием температурных условий, с учетом работы Халлмана и Мэнгана (1997 год).

Режимы 1 и 2 были основаны на работе Де Лима и др. (2007 год) и были разработаны при использовании сортов "Ellendale" и "Murcott".

Справочные материалы

De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Cruickshank, L., Walsh, C.J. & Mansfield, E.R. 2007. Cold disinfestation of citrus (*Citrus* spp.) for Mediterranean fruit fly (*Ceratitis capitata*) and Queensland fruit fly (*Bactrocera tryoni*) (Diptera: Tephritidae). *New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science*, 35: 39–50.

Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In G.L. Obenauf, ed. *1997 Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reduction*, San Diego, CA, USA, Nov. 3–5. pp. 79-1–79-4.

История публикации

История публикации не является официальной частью стандарта.

2007-09 Обработка направлена в ответ на Запрос обработок.

2007-12 На встрече ТГЭФО скомбинированы Обработка холодом *Citrus reticulata* x *C. sinensis* против *Ceratitis capitata* 2007-106 и 2007-206D для создания 2007-206B.

2008-04 КФМ-3 добавила тему под разделом Обработки против плодовых мух.

2008-09 КС утвердил для консультации членов посредством электронного принятия решений.

2009-06 Направлена на консультацию членов.

2010-07 Текст изменен на встрече ТГЭФО и рекомендован КС для принятия на КФМ-7 (2012 год).

2011-11 КС направил комментарии посредством электронной почты.

2012-12 Текст изменен на встрече ТГЭФО и рекомендован КС для принятия КФМ.

2013-06 КС рекомендовал для принятия на КФМ-9.

МСФМ 28. 2007: **Приложение [XX]** Холодовая обработка против *Ceratitis capitata* на *Citrus reticulata* x *C. sinensis* (201[X] год), Рим, МККЗР, ФАО.

История публикации: Последние изменения в октябре 2013 года.